

Les races n'existent pas, vraiment ? Regardez les spécificités de certains médicaments...

écrit par Claude t.a.l | 18 septembre 2017

Faites attention avec OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé:

Avant de prendre ces comprimés, informez votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes:

- Problèmes rénaux,
- Maladie du foie,
- Insuffisance cardiaque ou problèmes avec vos valves cardiaques ou votre muscle cardiaque,
- Vomissements sévères, diarrhée, traitement à forte dose par des médicaments qui augmentent la quantité d'urine que vous produisez (diurétiques) ou si vous suivez un régime pauvre en sel,
- Taux élevés de potassium dans votre sang,
- Problèmes avec vos glandes surrénales.

Comme avec tout médicament qui réduit la pression artérielle, une baisse excessive de la pression artérielle chez des patients présentant des perturbations de la circulation sanguine au niveau du cœur ou du cerveau peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Votre médecin doit donc vérifier votre pression artérielle avec précaution.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. OLMETEC est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir la rubrique « Grossesse et allaitement »).

Enfants et adolescents (moins de 18 ans)

OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé est déconseillé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Sujets âgés

Si vous avez plus de 65 ans et que votre médecin décide d'augmenter votre dose d'olmésartan médoxomil à 40 mg par jour, il devra surveiller régulièrement votre pression artérielle afin de s'assurer qu'elle ne diminue pas trop.

Patients de race noire

Comme avec d'autres médicaments similaires, l'effet d'OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé pour diminuer la pression artérielle peut être un peu plus faible chez les patients de race noire.

En complément de l'article de Gros Louis

<http://resistancerepublicaine.com/2017/09/17/les-blancs-ne-dis-paraitront-pas-ce-sont-les-nouveaux-venus-qui-vont-degenerer-sous-notre-climat/>

Seul le racisme existe mais les races n'existeraient pas, vraiment ?

Voici, par exemple, dans le « Répertoire des Spécialités Pharmaceutiques », publié par l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) les conditions d'utilisation de « OLMETEC » (un médicament contre l'hypertension) :

Notice officielle pour OLMETEC 10 mg, comprimés pelliculés

Attention: prendre avec précaution. Éviter une consommation excessive de boissons alcoolisées.

Indications thérapeutiques

Hypertension artérielle.

Insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale chronique ou insuffisance hépatique.

Insuffisance artérielle. Éviter l'association avec des médicaments qui agissent sur le système cardiovasculaire ou sur le système rénal.

Une baisse de pression artérielle est possible.

Précautions d'emploi

Comme avec tout médicament, il existe certaines précautions, certaines restrictions de la posologie applicables chez les patients présentant des pathologies ou à l'occasion de certaines situations de prise de médicaments. Il est recommandé de lire attentivement la notice avant de commencer le traitement.

Il est recommandé de lire attentivement la notice avant de commencer le traitement. OLMETEC est déconseillé en début de grossesse et au 3^{ème} trimestre de la grossesse. Il est déconseillé de prendre OLMETEC pendant l'allaitement. Une grossesse ou un allaitement pendant le traitement avec OLMETEC peut entraîner une baisse de la pression artérielle.

Précautions d'emploi

OLMETEC 10 mg, comprimés pelliculés, déconseillé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Effets indésirables

Il existe une possibilité de 40 personnes sur 1000 de ressentir des effets indésirables lors de l'administration d'OLMETEC 10 mg, comprimés pelliculés. Les effets indésirables les plus fréquents sont une baisse de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Précautions d'emploi

Comme avec tout médicament, il existe certaines précautions, certaines restrictions de la posologie applicables chez les patients présentant des pathologies ou à l'occasion de certaines situations de prise de médicaments. Il est recommandé de lire attentivement la notice avant de commencer le traitement.

<http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=68573412&typedoc=N&ref=N0189142.htm>

On peut y lire ceci :

« Patients de race noire

Comme avec d'autres médicaments similaires, l'effet d'OLMETEC 10 mg, comprimés pelliculés pour diminuer la pression artérielle peut être un peu plus faible chez les patients de race noire. »

Alors ?